

第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

カコナル[®]葛根湯顆粒[満量処方]

カコナル葛根湯顆粒〈満量処方〉の特徴

- ひきははじめのかぜに良く効く葛根湯製剤です。
- 葛根湯製剤の中でも、日本薬局方葛根湯エキスを全量配合している満量処方です。
- 葛根湯製剤ですので眠くなる成分を含んでおりません。
- 本品はお湯に溶かして服用することもできます。

「満量処方」とは？

日本薬局方葛根湯25g処方より得たエキスを全量（最大量）配合していることを意味します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい

効 能・効 果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用 法・用 量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回 朝昼夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用して下さい。またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服して下さい
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上 7 歳未満	1/2包	
2歳以上 4 歳未満	1/3包	
2 歳未満	服用しないで下さい	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成 分・分 量

本品は、淡褐色～褐色の顆粒剤で、3包（1包2g）中に次の成分を含有します。

日局 葛根湯エキス（乾燥）・・・・・・5.56g

下記の生薬の水製抽出エキス

〔日局カッコン・・・8g、日局マオウ・・・4g、日局タイソウ・・・4g、日局ケイヒ・・・3g、
日局ジャクヤク・・・3g、日局カンゾウ・・・2g、日局ショウキョウ・・・1g〕

添加物：D-マンニトール、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

《成分・分量に関連する注意》

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269